

ワクチンの種別	対象年齢		標準的な接種期間	回 数	間 隔
ロタウイルス (※経口接種)	1 価	出生 6 週 0 日 後～24 週 0 日 後	生後 2 か月～出生 14 週 6 日後 ※初回は出生 14 週 6 日後までに接 種することが望ま しい。	2 回	27 日以上
	5 価	出生 6 週 0 日 後～32 週 0 日 後	生後 2 か月～出生 14 週 6 日後 ※初回は出生 14 週 6 日後までに接 種することが望ま しい。	3 回	27 日以上
B 型肝炎	1 歳未満		生後 2 か月～9 か 月未満	初回：2 回 追加：1 回	初回：27 日以上 追加：第 1 回目の注 射から 139 日以上
Hib (ヘモフィルス・インフ レンザ菌 b 型)	生後 2 か月～5 歳未満		初回接種開始は生 後 2 か月～7 か月 未満 追加接種は初回終 了後 7 か月～13 か 月までの間隔をお く	(初回開始：生後 2 か月～7 か月未満) 初回：3 回 追加：1 回	初回：27 日以上(標準 的には 27～56 日) 追加：初回接種終了 後 7 か月以上(標準 的には 7 か月～13 か 月) (※ 1)
				(初回開始：生後 7 か月～1 歳未満)初 回：2 回 追加：1 回	初回：27 日以上(標準 的には 27～56 日) 追加：初回接種終了 後 7 か月以上(標準 的には 7 か月～13 か月) (※ 1)
				(初回開始：生後 1 歳～5 歳未満) 1 回	

小児用肺炎球菌	生後 2 か月～5 歳未満	初回接種開始は生後 2 か月～7 か月未満 追加接種は初回接種終了後、60 日以上あけて 1 歳～1 歳 3 か月未満	(初回開始：生後 2 か月～7 か月未満) 初回：3 回 追加：1 回	初回：標準的には生後 1 歳までに 27 日以上（※ 2） 追加：初回接種終了後 60 日以上あけて 1 歳以降
			(初回開始：生後 7 か月～1 歳未満) 初回：2 回 追加：1 回	初回：標準的には生後 1 歳までに 27 日以上（※ 3） 追加：初回接種終了後 60 日以上あけて 1 歳以降
			(初回開始：生後 1 歳～2 歳未満) 2 回	60 日以上
			(初回開始：生後 2 歳～5 歳未満) 1 回	
四種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ）	第 1 期：生後 2 か月～7 歳 6 か月未満	第 1 期初回：生後 2 か月～1 歳未満 第 1 期追加：1 期初回接種終了後 1 年～1 年半までの間隔をおく	初回：3 回 追加：1 回	初回：20 日以上（標準的には 20～56 日） 追加：1 期初回接種終了後 6 か月以上
二種混合	第 2 期：11 歳以上 13 歳未満	11 歳～12 歳未満	1 回	
BCG	1 歳未満	生後 5 か月～8 か月未満	1 回	
麻しん・風しん混合	第 1 期：1 歳～2 歳未満		1 回	
	第 2 期：5 歳～7 歳未満（小学校就学前 1 年間）		1 回	
水痘	1 歳～3 歳未満	1 回目：1 歳～1 歳 3 か月未満 2 回目：1 回目接種終了後 6 か月～1 年までの間隔をおく	2 回	3 か月以上（標準的には 6 か月～1 年まで）

日本脳炎	第1期：生後6か月～ 7歳6か月未満	第1期初回：3歳～4 歳未満 第1期追加：4歳～ 5歳未満	初回：2回 追加：1回	初回：6日以上(標準 的には6日～28 日) 追加：第1期初回接 種終了後6か月以上 (標準的にはおおむ ね1年)
	第2期：9歳～13歳未 満	9歳～10歳未満	1回	
ヒトパピローウイルス感染 症（子宮頸がん）	小学校6年生から高校 1年生相当の女子	中学1年生	2価：3回	2価：1か月の間隔を おいて2回接種後、 1回目の接種から6 か月以上の間隔をお く
			4価：3回	4価：2か月の間隔 をおいて2回接種 後、1回目の接種か ら6か月以上の間隔 をおく
			9価：(※4)	9価：(※4)

- ※1 ただし、2回目及び3回目の接種は生後1歳までに行いそれを超えた場合は行わない。追加接種は実施可能であるが、初回接種終了後27日以上の間隔をおいて1回行う。
- ※2 ただし、2回目及び3回目の接種は生後2歳までに行いそれを超えた場合は行わない。（追加接種は実施可能。）また、2回目の接種は生後1歳までに行いそれを超えた場合、初回接種の3回目は行わない。（追加接種は実施可能。）
- ※3 ただし、2回目の接種は生後2歳までに行いそれを超えた場合は行わない。（追加接種は実施可能。）
- ※4 1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合
→2回接種。1回目を接種した後、6か月後に2回目を接種。
1回目の接種を15歳になってから受ける場合
→3回接種。2か月の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から6か月以上の間隔をおく。