

子どもの予防接種

ワクチンの種別	対象年齢		標準的な接種期間	回数	間隔
ロタウイルス (※経口接種)	1価	出生6週0日後～24週0日後	生後2か月～出生14週6日後 ※初回は出生14週6日後までに接種することが望ましい。	2回	27日以上
	5価	出生6週0日後～32週0日後	生後2か月～出生14週6日後 ※初回は出生14週6日後までに接種することが望ましい。	3回	27日以上
B型肝炎	1歳未満		生後2か月～9か月未満	初回：2回 追加：1回	初回：27日以上 追加：第1回目の注射から139日以上
小児用肺炎球菌	生後2か月～5歳未満		初回接種開始は生後2か月～7か月未満 追加接種は初回接種終了後、60日以上あけて1歳～1歳3か月未満	(初回開始：生後2か月～7か月未満) 初回：3回 追加：1回	初回：標準的には生後1歳までに27日以上(※1) 追加：初回接種終了後60日以上あけて1歳以降
				(初回開始：生後7か月～1歳未満) 初回：2回 追加：1回	初回：標準的には生後1歳までに27日以上(※2) 追加：初回接種終了後60日以上あけて1歳以降
				(初回開始：生後1歳～2歳未満) 2回	60日以上
				(初回開始：生後2歳～5歳未満) 1回	

ワクチンの種別	対象年齢	標準的な接種期間	回数	間隔
五種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ）	第1期：生後2か月～7歳6か月未満	第1期初回：生後2か月～生後7か月未満 第1期追加：1期初回接種終了後6か月～1年半までの間隔をおく	初回：3回 追加：1回	初回：20日以上(標準的には20～56日) 追加：1期初回接種終了後6か月以上
二種混合	第2期：11歳以上13歳未満	11歳～12歳未満	1回	
BCG	1歳未満	生後5か月～8か月未満	1回	
麻しん・風しん混合	第1期：1歳～2歳未満		1回	
	第2期：5歳～7歳未満 (小学校就学前1年間)		1回	
水痘	1歳～3歳未満	1回目：1歳～1歳3か月未満 2回目：1回目接種終了後6か月～1年までの間隔をおく	2回	3か月以上 (標準的には6か月～1年まで)
日本脳炎	第1期：生後6か月～7歳6か月未満	第1期初回：3歳～4歳未満 第1期追加：4歳～5歳未満	初回：2回 追加：1回	初回：6日以上(標準的には6日～28日) 追加：第1期初回接種終了後6か月以上 (標準的にはおおむね1年)
	第2期：9歳～13歳未満	9歳～10歳未満	1回	
ヒトパピローウイルス感染症（子宮頸がん）	12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度末までの間にある（小学校6年生から高校1年生相当の）女子	13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間（中学1年生相当）	3回 (1回目接種を15歳になるまでに受ける場合は2回)	2か月の間隔において2回接種後、1回目の接種から6か月以上の間隔をおく (※3)

妊婦の予防接種

ワクチンの種別	対象年齢	標準的な接種期間	回数	間隔
RS ウイルス感染症	妊娠 28 週 0 日から 36 週 6 日までの妊婦		1 回	

- ※1 ただし、2 回目及び 3 回目の接種は生後 2 歳までに行いそれを超えた場合は行わない。(追加接種は実施可能。) また、2 回目の接種は生後 1 歳までに行いそれを超えた場合、初回接種の 3 回目は行わない。(追加接種は実施可能。)
- ※2 ただし、2 回目の接種は生後 2 歳までに行いそれを超えた場合は行わない。(追加接種は実施可能。)
- ※3 1 回目の接種を 1 5 歳になるまでに受ける場合は、1 回目を接種した後、6 か月後に 2 回目を接種。